
CCAG−490
GSZ
20
15
10
5
0
−5
−10


CCAG−490
GSZ
20
15
10
5
0
−5
−10
Atypical
Classical
Mesenchymal
Basal


Enrichment in spots: CCAG−490
log(p.value)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R


Expression of CCAG−490 in Spot A
1.0
0.5
0.0
−0.5
Δe


Expression of CCAG−490 in Spot B
Δe
1.0
0.5
0.0
−0.5


Expression of CCAG−490 in Spot C
1.0
0.5
0.0
−0.5
Δe


Expression of CCAG−490 in Spot D
1.0
0.5
0.0
−0.5
Δe


Expression of CCAG−490 in Spot E
1.0
0.5
0.0
−0.5
Δe


Expression of CCAG−490 in Spot F
1.0
0.5
0.0
−0.5
Δe


Expression of CCAG−490 in Spot G
1.0
0.5
0.0
−0.5
Δe


Expression of CCAG−490 in Spot H
1.0
0.5
0.0
−0.5
Δe


Expression of CCAG−490 in Spot I
1.0
0.5
0.0
−0.5
Δe


Expression of CCAG−490 in Spot J
1.0
0.5
0.0
−0.5
Δe


Expression of CCAG−490 in Spot K
Δe
1.0
0.5
0.0
−0.5


Expression of CCAG−490 in Spot L
Δe
1.0
0.5
0.0
−0.5


Expression of CCAG−490 in Spot M
1.0
0.5
0.0
−0.5
Δe


Expression of CCAG−490 in Spot N
1.0
0.5
0.0
−0.5
Δe


Expression of CCAG−490 in Spot O
1.0
0.5
0.0
−0.5
Δe


Expression of CCAG−490 in Spot P
Δe
1.0
0.5
0.0
−0.5


Expression of CCAG−490 in Spot Q
1.0
0.5
0.0
−0.5
Δe


Expression of CCAG−490 in Spot R
1.0
0.5
0.0
−0.5
Δe